

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
АРФАЗЕТИН - ЭК

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
P N 003195/02

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.

Арфазетин – ЭК.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ.**

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.

Сбор - порошок.

СОСТАВ.

Фасоли обыкновенной плодов створки	20 %
Черники обыкновенной побеги	20 %
Шиповника плоды	15 %
Элеутерококка колючего корневища и корни	15 %
Зверобоя трава	10 %
Ромашки аптечной цветки	10 %
Хвоща полевого трава	10 %

ОПИСАНИЕ.

Смесь неоднородных частиц растительного сырья серовато-зеленого цвета с серовато-белыми, желтыми, темно-зелеными, кремовыми, красновато-коричневыми и коричневыми вкраплениями. Запах слабый, ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-кислый.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.

Гипогликемическое средство растительного происхождения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Настой сбора оказывает гипогликемическое действие, способствует снижению содержания глюкозы в крови, увеличивает толерантность к углеводам и усиливает гликогенобразующую функцию печени.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Сахарный диабет 2 типа (инсулиннезависимый): при легкой форме – в сочетании с диетой и физическими упражнениями, при диабете средней тяжести - в сочетании с пероральными гипогликемическими лекарственными средствами или инсулином.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Повышенная чувствительность к препарату, нефрит, артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, повышенная возбудимость, бессонница, эпилепсия, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.

1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 15 мин, периодически надавливая на пакетик ложкой, затем его отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь по 1/3 - 1/2 стакана теплого настоя 2-3 раза в день за 30 мин до еды в течение 20-30 дней. Через 10-15 дней курс лечения рекомендуется повторить. В течение года проводят 3-4 курса (по согласованию с лечащим врачом). Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Возможны аллергические реакции, изжога, повышение артериального давления, бессонница. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА.

До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

При совместном применении с пероральными гипогликемическими лекарственными средствами возможно усиление гипогликемического действия настоя препарата «Арфазетин-ЭК». Если Вы применяете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в т.ч. безрецептурные), перед применением препарата «Арфазетин-ЭК» проконсультируйтесь с врачом.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

Применение препарата необходимо согласовать с лечащим врачом.

Не рекомендуется применять препарат «Арфазетин-ЭК» во второй половине дня во избежание нарушений сна.

При применении настоя препарата «Арфазетин-ЭК» в сочетании с пероральными гипогликемическими средствами, инсулином необходимо соблюдать правила приема, меры предосторожности и учитывать противопоказания, предусмотренные для этих препаратов.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т. ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

ФОРМА ВЫПУСКА.

Сбор - порошок. По 2,0 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА.

Отпускают без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.


ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»



Р.Р. Алиева



133137