

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ФИТОДИАРИН®

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.

Фитодиарин®.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Лапчатки прямостоячей корневища +Мать-и-мачехи обыкновенной листья+
Подорожника большого листья +Тысячелистника обыкновенного трава +
Шалфея лекарственного листья.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.

Сбор - порошок.

СОСТАВ.

Лапчатки прямостоячей корневища	37,5 %
Подорожника большого листья	25,0 %
Мать-и-мачехи обыкновенной листья	12,5 %
Тысячелистника обыкновенного трава	12,5 %
Шалфея лекарственного листья	12,5 %

ОПИСАНИЕ.

Смесь частиц растительного сырья серовато-зеленого цвета с беловатыми, желтоватыми, светло-коричневыми, красновато-коричневыми и темно-коричневыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-вяжущий с ощущением слизистости.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.

Растительного происхождения средство.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Настой сбора оказывает антимикробное (обладает бактериостатической активностью в отношении грамположительных бактерий рода Staphylococcus, грамотрицательных бактерий родов Escherichia, Proteus, Pseudomonas; фунгистатической активностью в отношении мицелиальных грибов рода Microsporum и рода Trichophyton), вяжущее, противовоспалительное действие.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

В составе комплексной терапии острых и хронических кишечных инфекций, сопровождающихся диареей, дисбактериоза кишечника, воспалительных заболеваний кожи (пиодермия), полости рта (гингивит, стоматит), глотки (острый тонзиллит).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжелые нарушения функции печени, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.

2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 30 мин, периодически надавливая на пакетики ложкой, затем их отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

В терапии острых и хронических кишечных инфекций, дисбактериоза кишечника принимают внутрь по 1/2 стакана теплого настоя 3 раза в день за 30 мин до еды или через 1 час после еды. Курс лечения 3-4 недели.

При воспалительных заболеваниях полости рта и глотки применяют местно для полосканий по 1/2 стакана теплого настоя 3-4 раза в день.

При воспалительных заболеваниях кожи настоей применяют наружно в виде примочек.

Перед применением настоей рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА.

При применении препарата с превышением рекомендуемых доз и рекомендуемого курса лечения возможно развитие раздражающего действия на желудочно-кишечный тракт и печень.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.

Не описано.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 2 недель следует сообщить об этом врачу.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т. ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

ФОРМА ВЫПУСКА.

Сбор-порошок. По 2,0 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.


В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ.

3 года.
Не применять по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА.

Отпускают без рецепта.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.**

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»



Р.Р. Алиева

135059