

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Солодки корни
(Glycyrrhizae radices)

Регистрационный номер

Торговое наименование.
Солодки корни.

Международное непатентованное или группировочное наименование.
Солодки корни.

Лекарственная форма.
Корни порошок.

Состав.
Солодки корни.

Характеристика.
Корни солодки содержат глицирризиновую кислоту, сапонины, флавоноиды и другие биологически активные вещества.

Описание.
Кусочки сырья различной формы, как правило, волокнистые. Цвет желтый, серовато-желтый, коричневато-желтый, с остатками пробки серовато-коричневого или коричневого цвета. Запах слабый. Вкус водного извлечения сладкий, приторный, слегка раздражающий.

Фармакотерапевтическая группа.
Средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.
Настой корней солодки оказывает отхаркивающее, противовоспалительное действие.

Показания к применению.
В комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей (главным образом при наличии плохо отделяемого, густого и вязкого сокрета); гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комплексной терапии).

143419

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату, бронхиальная астма; гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы.

1 фильтр-пакет (1,5 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают крышкой и настаивают при комнатной температуре 30 мин. Фильтр-пакет отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Взрослым и детям старше 12 лет настой назначают внутрь в теплом виде по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Детям от 1 года до 3 лет - по 1 чайной ложке 2-3 раза в день; от 3 до 5 лет - по 1 десертной ложке 2-3 раза в день; от 5 до 12 лет - по 1 десертной ложке 3-4 раза в день. Курс лечения - 2-3 недели. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если через 7 дней лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции; в отдельных случаях могут наблюдаться диспепсические явления (диарея).

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

При длительном применении в дозах, превышающих рекомендованные, возможно повышение артериального давления, гипокалиемия, появление периферических отеков вследствие нарушения водно-солевого обмена. Лечение симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Возможно одновременное назначение других лекарственных средств, применяемых при лечении бронхолегочных заболеваний. Не следует применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин, и другими противокашлевыми средствами, так как это затрудняет откашивание разжиженной мокроты.

Особые указания.

Перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом. Во избежание передозировки, рекомендуется соблюдать режим дозирования препара-

та. При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 7 дней, следует сообщить об этом врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска.

Корни порошок. По 1,5 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

Условия хранения.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска.

Отпускают без рецепта.


Производитель/Владелец регистрационного удостоверения.

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»

Р.Р. Алиева



143419