

## МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ ТРАВА**

(Artemisiae absinthii herba)

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР****ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**

Полыни горькой трава.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Полыни горькой трава.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**

Трава измельченная.

**СОСТАВ.**

Полыни горькой трава.

**ХАРАКТЕРИСТИКА.**

Полыни горькой трава содержит горечь (абсинтин), эфирные масла, сесквитерпеновые лактоны, флавоноиды, дубильные вещества.

**ОПИСАНИЕ.**

Смесь кусочков стеблей, листьев, соцветий. Цвет стеблей от зеленовато-серого до зеленовато-желтого, листьев – от серовато-зеленого до серебристо-серого, соцветий - желтый. Запах ароматный, своеобразный, сильный. Вкус водного извлечения пряно-горький.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**

Аппетита стимулятор растительного происхождения (горечь).

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Настой травы полыни горькой усиливает секрецию желудочного сока, повышает аппетит, улучшает пищеварение, обладает желчегонными свойствами.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.**

Для повышения аппетита и улучшения функции органов желудочно-кишечного тракта: гипо- и анацидный гастрит; хронический холецистит; дискинезия желчевыводящих путей.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Повышенная чувствительность к препарату. Повышенная желудочная секреция,

гиперацидный гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рефлюкс-эзофагит, острый холецистит; калькулезный холецистит; беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

### **ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.**

Противопоказано применение при беременности и в период грудного вскармливания.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

Около 10 г (2 столовые ложки) травы помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения - 20-25 дней. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Возможны аллергические реакции; изжога, гастралгия, диарея, тошнота, рвота (при длительном применении).

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, следует обратиться к врачу.

### **ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

Симптомы: тремор, головная боль, головокружение, галлюцинации, судороги. Лечение: симптоматическое.

### **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.**

Не описано.

### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.**

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 2 недель следует обратиться к врачу.

### **ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентра-

