

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

**Крушины кора**  
(Frangulae cortex)

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР**

**ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**

Крушины кора.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Крушины ольховидной кора.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**

Кора измельченная.

**СОСТАВ.**

Крушины ольховидной кора.

**ХАРАКТЕРИСТИКА.**

Кора крушины содержит антраценпроизводные, хризофановую кислоту, дубильные вещества, органические кислоты, эфирное масло и др.

**ОПИСАНИЕ.**

Кусочки коры различной формы. Цвет коры с наружной стороны темно-коричневый, серо-коричневый, темно-серый или серый, с внутренней – желтовато-оранжевый или красновато-коричневый. Запах слабый. Вкус водного извлечения горьковатый.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**

Слабительное средство растительного происхождения.

Код АТХ: А06А.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Отвар коры крушины оказывает слабительное действие, обусловленное наличием антраценпроизводных гликозидов, вызывающих раздражение рецепторов слизистой оболочки толстого кишечника. Слабительный эффект обычно наступает через 8 - 12 часов после приема препарата.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.**

Хронический запор.

МИНЗДРАВ РОССИИ

140622

СОГЛАСОВАНО

145379

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Повышенная чувствительность к препарату, запоры неврогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, кишечная непроходимость, синдром острого живота, аппендицит, энтерит, колит, метроррагия, острые лихорадочные состояния. Беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

## **ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

Около 10 г (1 столовая ложка) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 30 мин, охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой до 200 мл.

Отвар принимают внутрь в теплом виде взрослые и дети старше 12 лет по 1/2 стакана на ночь и утром. Курс лечения 1-2 недели. Перед применением отвар рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

## **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь), ощущение дискомфорта в животе (метеоризм, спастические боли, тошнота).

При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

## **ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

Симптомы: коликообразные боли в животе, тенезмы, тошнота, рвота, диарея. Лечение: симптоматическое.

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.**

Не описано.

## **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.**

При длительном применении препаратов крушины может развиваться привыкание и ослабление или отсутствие слабительного эффекта, поэтому целесообразно чередовать их с другими слабительными средствами. Возможно окрашивание мочи в желтый цвет, не требующее отмены препарата.

Не рекомендуется длительный прием препарата без консультации врача.

## **ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

## **ФОРМА ВЫПУСКА.**

Кора измельченная. По 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 г в пачку картонную с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой, или бумаги ламинированной, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C. Готовый отвар хранить в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.

## **СРОК ГОДНОСТИ.**

5 лет.  
Не применять по истечении срока годности.

## **УСЛОВИЯ ОТПУСКА.**

Отпускают без рецепта.


## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.**

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.  
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор  
ООО Фирма «Здоровье»



Р.Р. Алиева



145379