

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

УКРОПА ПАХУЧЕГО ПЛОДЫ

(*Anethi graveolentis fructus*)

МИНЗДРАВ РОССИИ

120722

СОГЛАСОВАНО

Регистрационный номер

Торговое наименование.

Укропа пахучего плоды.

Международное непатентованное или группировочное наименование.

Укропа пахучего плоды.

Лекарственная форма.

Плоды цельные.

Состав.

Укропа пахучего плоды.

Характеристика.

Плоды содержат эфирное масло, флавоноиды, жирное масло и др.

Описание.

Отдельные полуплодики (мерикарпии), реже цельные плоды (вислоплодники) длиной 3 – 7 мм, шириной 1,5 – 4 мм, овальные, слабовыпуклые снаружи и плоские на внутренней стороне; каждый полуплодик с 3 нитевидными спинными ребрами и 2 плоскими крыловидными боковыми. Цвет полуплодиков светло-коричневый, коричневато-серый или коричневый, иногда с зеленым оттенком, с более светлыми спинными ребрами и коричневато-белыми, иногда с зеленым оттенком – краевыми ребрами. Запах сильный, ароматный. Вкус водного извлечения сладковато-пряный, несколько жгучий.

Фармакотерапевтическая группа.

Спазмолитическое средство растительного происхождения.

Фармакологическое действие.

Настой плодов укропа пахучего оказывает спазмолитическое, повышающее секрецию пищеварительных желез, противовоспалительное, гипотензивное, ветрогонное и отхаркивающее действие; способствует выработке молока у кормящих матерей.

Показания к применению.

Спазмы гладкой мускулатуры желудочно-кишечного тракта, метеоризм, запор; воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (в комплексной терапии).

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к препарату; беременность.

С осторожностью.

Артериальная гипотензия.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания.

Применение препарата при беременности противопоказано.

Применение препарата в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы.

Около 10 г (2 столовые ложки) плодов помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Настой принимают внутрь в теплом виде 3 - 4 раза в сутки: взрослые и дети старше 12 лет - по 1/3 стакана; дети от 7 до 12 лет - по 1-2 столовые ложки; дети от 3 до 7 лет - по 1 столовой ложке; дети до 3-х лет - по 1/2 -1 чайной ложке. Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Побочное действие.

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или появились другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка.

Симптомы: снижение артериального давления; лечение - симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами.

Не описано.

Особые указания.

При сохранении спастических коликообразных болей в кишечнике в течение

