

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА****БАГУЛЬНИКА БОЛОТНОГО ПОБЕГИ***(Ledi palustris cornus)***РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР****ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**

Багульника болотного побеги.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Багульника болотного побеги.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**

Побеги измельченные.

**СОСТАВ.**

Багульника болотного побеги.

**ХАРАКТЕРИСТИКА.**

Побеги багульника болотного содержат эфирное масло, флавоноиды и другие биологически активные вещества.

**ОПИСАНИЕ.**

Смесь кусочков стеблей, листьев и плодов. Цвет зеленый, темно-зеленый, оранжево-коричневый, серовато-коричневый. Запах резкий, специфический. Вкус водного извлечения не определяется.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**

Отхаркивающее средство растительного происхождения.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Настой побегов багульника болотного оказывает отхаркивающее действие; обладает противовоспалительными, противомикробными и гипотензивными свойствами; оказывает возбуждающее действие на центральную нервную систему и миоэпителий.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.**

Применяют у взрослых в качестве отхаркивающего средства при воспалительных заболеваниях дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (бронхит, трахеит).

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Повышенная чувствительность к препарату, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 18 лет.

### **ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

Около 10 г (2 столовые ложки) измельченных побегов помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей кипяченой воды, накрывают и настаивают на кипящей водяной бане 15 мин, охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Принимают внутрь по 1/3 – 1/4 стакана теплого настоя 2-3 раза в день. Курс лечения 2 недели. Перед применением настоя рекомендуется взбалтывать.

Если в период лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Возможны аллергические реакции, головокружение, повышенная нервная возбудимость, при приеме высоких доз отмечаются симптомы возбуждения или угнетения центральной нервной системы.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

Симптомы возможной передозировки: слабость, сонливость, головная боль, тошнота, рвота, усиленное потоотделение, понижение артериального давления; в тяжелых случаях – угнетение дыхания, удушье, галлюцинации, возможна потеря сознания. Лечение: симптоматическое, прием активированного угля, при необходимости – проведение искусственного дыхания.

### **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.**

Не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными средствами, так как это затрудняет откашливание разжиженной мокроты. Если Вы принимаете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в



том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

### **ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.**

В период лечения препаратом следует воздержаться от выполнения потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

### **ФОРМА ВЫПУСКА.**

Побеги измельченные. По 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 г в пачке картонной с внутренним пакетом из пленки полипропиленовой, или бумаги ламинированной, или бумаги с полиэтиленовым покрытием. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

### **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C. Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток. Хранить в недоступном для детей месте.

### **СРОК ГОДНОСТИ.**

3 года.  
Не применять по истечении срока годности.

### **УСЛОВИЯ ОТПУСКА.**

Отпускают без рецепта.

### **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.**

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.  
Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор  
ООО Фирма «Здоровье»



142345

Р.Р. Алиева

