

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ЭВКАЛИПТА ПРУТОВИДНОГО ЛИСТЬЯ
(*Eucalypti viminalis folia*)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР
ЛС-001424

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.
Эвкалипта прутовидного листа.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ.**
Эвкалипта прутовидного листа.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.
Листья порошок.

СОСТАВ.
Эвкалипта прутовидного листа.

ХАРАКТЕРИСТИКА.
Листья эвкалипта содержат эфирное масло, дубильные вещества, флавоноиды, органические кислоты и другие биологически активные вещества.

ОПИСАНИЕ.
Кусочки листовой пластинки и черешков различной формы серовато-зеленого и темно-зеленого цвета с коричневатыми и беловатыми вкраплениями. Запах ароматный. Вкус водного извлеченияпряно-горький.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.
Антисептическое средство растительного происхождения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.
Настой листьев эвкалипта оказывает противомикробное, противовоспалительное действие.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.
В составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний глотки и верхних дыхательных путей (фарингит, ларингит, трахеит).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Повышенная чувствительность к препарату, детский возраст до 3 лет. Для ингаляций – бронхиальная астма, бронхоспазм, коклюш.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ.

Детский возраст старше 3 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.

2 фильтр-пакета (3,0 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 15 мин. Фильтр-пакеты отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Применяют местно по 1/2 - 1 стакану теплого настоя: ингаляции проводят в соответствии с рекомендациями врача 2 раза в день, полоскания 3 - 4 раза в день. Курс лечения 2-3 недели. Перед применением настоей рекомендуется взбалтывать.

Если через 1 неделю лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Возможны аллергические реакции.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА.

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.

Не описано.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

Если при применении препарата симптомы сохраняются более одной недели, то следует обратиться к врачу. При появлении одышки, лихорадки или гнойной

