

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  
ЖЕЛУДОЧНЫЙ СБОР №3**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР  
Р N002690/02**

**ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**

Желудочный сбор №3.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ ИЛИ ГРУППИРОВОЧНОЕ  
НАИМЕНОВАНИЕ.**

Аира обыкновенного корневища + Валерианы лекарственной корневища с корнями + Крапивы двудомной листья+Крушины ольховидной коры+Мяты перечной листья.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**

Сбор - порошок.

**СОСТАВ.**

Крапивы двудомной листья	30 %
Крушины ольховидной коры	30 %
Мяты перечной листья	20 %
Аира обыкновенного корневища	10 %
Валерианы лекарственной корневища с корнями	10 %

**ОПИСАНИЕ.**

Смесь неоднородных частиц растительного сырья темно-зеленого цвета с многочисленными желтовато-коричневыми, желтовато-оранжевыми, а также серовато-зелеными, зелеными, желтовато-белыми и темно-коричневыми включениями. Запах ароматный. Вкус водного извлечения горьковато-пряный, слегка холодящий.

**ФАРМАКОТЕРАПЕТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**

Растительного происхождения средство.

**ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Настой сбора оказывает противовоспалительное, спазмолитическое, желчегонное и «мягкое» слабительное действие.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.**

В качестве симптоматического средства при заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся болями спастического характера; запор

133431

(в качестве «мягкого» слабительного средства).

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; калькулезный холецистит, кишечная непроходимость, спастические запоры, кровотечения из желудочно-кишечного тракта, синдром «острого» живота, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

### **ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.**

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания.

### **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

1 фильтр-пакет (2 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) кипятка, накрывают и настаивают 30 мин, периодически надавливая на пакетик ложкой, затем его отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 100 мл.

Принимают внутрь по 1/2 стакана теплого настоя утром и вечером. Длительность курса лечения зависит от характера заболевания и определяется лечащим врачом. Перед применением настой рекомендуется взбалтывать.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

### **ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.**

Возможны аллергические реакции. При длительном применении возможны чувство жажды, головная боль, боли в области сердца, снижение массы тела, ослабление или отсутствие слабительного эффекта, запор.

Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

### **ПЕРЕДОЗИРОВКА.**

Возможны коликообразные боли в животе. Лечение: симптоматическое.

### **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.**

Не описано.

### **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.**

Если при применении препарата симптомы сохраняются без улучшения более 2 недель или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

## **ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.**

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т. ч., управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

## **ФОРМА ВЫПУСКА.**

Сбор – порошок. По 2,0 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.**

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C.

Готовый настой хранить в прохладном месте не более 2 суток.

Хранить в недоступном для детей месте.

## **СРОК ГОДНОСТИ.**

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

## **УСЛОВИЯ ОТПУСКА.**

Отпускают без рецепта.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.**


ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул. 1812 года, д. 2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор  
ООО Фирма «Здоровье»



Р.Р. Алиева



133431