

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЭЛАКОСЕПТ®

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.

Элакосепт®.

**МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНОВАННОЕ ИЛИ
ГРУППИРОВОЧНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ.**

«~»

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.

Сбор-порошок.

СОСТАВ.

Календулы лекарственной цветки	20 %
Солодки корни	20 %
Шалфея лекарственного листья	20 %
Эвкалипта прутовидного листья	20 %
Ромашки аптечной цветки	10 %
Череды трехраздельной травы	10 %

ОПИСАНИЕ.

Смесь неоднородных частиц растительного сырья серо-зеленого цвета с вкраплениями оранжевого, желто-оранжевого, желтого, белого и коричневатого цвета. Запах ароматный. Вкус водного извлечения сладковатый.

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.

Противомикробное средство растительного происхождения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Настой «Элакосепта®» обладает антимикробной активностью в отношении стафилококка, кишечной палочки, синегнойной палочки, протея и некоторых других микроорганизмов; оказывает противовоспалительное действие и стимулирует репаративные процессы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

В составе комплексной терапии: заболеваний дыхательных путей и ЛОР-органов (хронический тонзиллит, острый ларингофарингит, острый и

хронический фарингит, трахеит, бронхит); в стоматологии (острый и рецидивирующий афтозный стоматит, красный плоский лишай слизистой оболочки полости рта, пародонтит); в гастроэнтэрологии (хронический гастродуоденит, энтерит, колит, энтероколит); в дерматологии (микробная экзема, нейродермит, розовые угри, вульгарные угри); в гинекологии (неспецифические воспалительные заболевания влагалища и шейки матки (кольпит, цервицит)); в урологии (хронический пиелонефрит, хронический цистит, уретрит, хронический простатит).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.

Применение препарата внутрь при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Применение препарата наружно и местно возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходимо проконсультироваться с врачом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.

Настой сбора применяют внутрь, наружно или местно (в том числе ингаляционно).

2 фильтр-пакета (4 г) помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, накрывают и настаивают 15 мин, периодически надавливая на фильтр-пакеты ложкой. Фильтр-пакеты отжимают, объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Для приема внутрь используют по 1/3 стакана теплого настоя 3 раза в день за 30 мин до еды. Наружно холодный настой используют в неразбавленном виде для примочек 1-2 раза в сутки. Для ингаляций применяют настой в горячем (теплом) неразбавленном виде, в том числе при проведении процедур на ультразвуковом ингаляторе. Для полосканий, орошений и спринцеваний настой разбавляют в 2 раза. Для микроклизм используют по 50 мл неразбавленного теплого настоя.

Настой применяют: при заболеваниях дыхательных путей и ЛОР-органов - одновременно внутрь и местно в виде полосканий и ингаляций 2-5 раз в сутки в течение 2-3 недель; в стоматологии - одновременно внутрь и местно в виде полосканий, орошений, примочек и для пропитывания турунд разбавленным в 2-4 раза теплым настоем 2-5 раз в сутки в течение 5-7 дней; в гастроэнтерологии - внутрь в течение 2-3 недель; в дерматологии - в течение 2-3 недель одновременно внутрь и наружно в виде примочек; в гинекологии - в течение 2-4 недель одновременно внутрь и местно 1-2 раза в сутки в виде спринцеваний,

орошений и примочек теплым разбавленным настоем; в урологии - внутрь и местно в виде микроклизм в течение 2-3 недель.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

ПЕРЕДОЗИРОВКА.

Случаи передозировки до настоящего времени не зарегистрированы.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ.

Не описано.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.

Для проведения ингаляций (в том числе с использованием ультразвукового ингалятора) следует использовать только теплый или горячий настой (при использовании холодного настоя возможно развитие бронхоспазма!).

При сохранении симптомов заболевания или ухудшении состояния на фоне применения препарата в течение 5-7 дней следует обратиться к врачу.

ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ УПРАВЛЯТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, МЕХАНИЗМАМИ.

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

ФОРМА ВЫПУСКА.

Сбор-порошок. По 2,0 г в фильтр-пакет из бумаги термосвариваемой; по 20 фильтр-пакетов укладывают в пачки картонные. Пачки упаковывают в пленку полипропиленовую. Текст инструкции по применению полностью наносится на пачку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25°C. Полученный настой следует использовать свежеприготовленным. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ.

2 года. Не применять по истечении срока годности.


УСЛОВИЯ ОТПУСКА.

Отпускают без рецепта.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ.**

ООО Фирма «Здоровье». Россия, 121170, г. Москва, ул.1812 года, д.2.

Адрес производства/адрес для предъявления претензий: Россия, 143430, Московская обл., г.о. Красногорск, рп. Нахабино, ул. Советская, д. 20А, телефон +7 (495) 566-00-14, lektrava.ru, sales@lektrava.ru

Генеральный директор
ООО Фирма «Здоровье»

135530